

## Selbstbeurteilungsskalen bei SchlaganfallpatientInnen

**Kommentar** von Price C.I.M., Curless R.H., Rodgers H. (1999: S 1361): *Can Stroke Patients Use Visual Analogue Scales?* Stroke 30: 1357-1361

„Diese Studie weist darauf hin, dass Vorsicht geboten ist, wenn traditionelle Skalen verwendet werden, um subjektive Daten über den Gesundheitsstatus von SchlaganfallpatientInnen mit höheren kortikalen Defiziten zu gewinnen. Skalen, die für die nicht-betroffene Population entwickelt und validiert wurden, sind möglicherweise für SchlaganfallpatientInnen weder valide noch hilfreich. Wir empfehlen, dass die VAS in jeglichem Format als Selbstbeurteilungsmessinstrument nach Schlaganfall nicht allgemein eingesetzt wird. Genaue Assessments für den subjektiven Gesundheitszustand nach Schlaganfall, wie z.B. beim Schmerz, werden in der Klinik und in der Forschung nach wie vor benötigt.“

Kommentar übersetzt von A. Tautscher-Basnett, Gailtal-Klinik.  
Hinweise/Korrekturvorschläge/Kommentare bitte direkt an [gusti.tautscherbasnett@kabeg.at](mailto:gusti.tautscherbasnett@kabeg.at)